情况说明书：
MODERNA COVID-19（新冠病毒）疫苗

辉瑞-Moderna 是美国现有的三种新冠疫苗之一。Moderna 疫苗需要接种两剂和随后的加强剂才能完全有效，尽管每剂都提供了一些针对严重疾病的保护。

Moderna 疫苗是一种 mRNA 疫苗。 它含有信使RNA (mRNA)。mRNA就像一本说明书。它教会您的身体如何生成一种与冠状病毒上相类似的无害蛋白质。然后您的身体会对这种蛋白质产生反应，产生能够识别和对抗这种冠状病毒的抗病细胞和抗体。这种疫苗：

- 不会使您感染新冠病毒。
- 不会改变您的DNA或遗传物质。
- 不会引起不孕症。
- 不含鸡蛋、防腐剂、乳胶、猪肉或其他动物制品，也不含胚胎细胞或冠状病毒。

Moderna 疫苗适用于 18 岁及以上的人群

如果您怀孕或哺乳、有严重过敏症、患有出血性疾病或使用血液稀释剂、免疫功能低下、接种过其他新冠病毒 (COVID-19) 疫苗或患有心肌炎或心包炎（心脏或心脏周围的囊发炎），请咨询您的医生或诊所。

轻度副作用

许多人在接种疫苗后会出现轻微的副作用，尤其是在第二次接种后。对于某些人来说，这表明您的身体正在建立针对疾病的防护屏障。

常见副作用包括：



注射部位疼痛或发红　　头痛



疲倦　　发热

这些症状通常会在几天内消失。如未消失，请咨询医生或诊所。

罕见的严重问题

过敏反应



有些人会出现严重的新冠疫苗过敏反应，但这种情况并不多见。所有人在接种疫苗后都必须在现场留观15分钟以上，以确保没有严重过敏反应。 如果您出现严重的过敏反应，请致电 9-1-1，或前往最近的医院。

心肌炎或心包炎



在接种 Moderna 或 Pfizer-BioNTech 新冠病毒 (COVID-19) 疫苗的人（主要是 12 - 39 岁的男性）中很少发生心肌炎（心肌炎症）和/或心包炎（心脏外膜炎症）。

在这些人中，大多数人会在接种第二剂疫苗后的几天内开始出现症状。发生这种情况的几率非常低 — 大约每 10,000 名年轻男性中有 1 人，而在其他人群中则要少得多。大多数病例都较为轻微且会自行好转。

如果您在接种该疫苗后出现任何以下症状，请立即寻求医疗护理：



胸痛



呼吸急促



感觉心跳加速

寻求帮助

对您的接种决定充满信心很重要。如果在阅读此信息后对服用 Moderna 疫苗有疑虑，您可以获取更多信息或选择接种不同的疫苗。

- 如有疑问，请在接种活动中与工作人员沟通。
- **也可提供其他品牌疫苗，但在今天的活动中可能不提供。如需帮忙寻找其他品牌疫苗，请咨询当日的接种活动组织人员、在线访问https://covidvaccine.oregon.gov/ 或致电2-1-1。**

扫我

有关 Moderna 疫苗的更多信息可以在 FDA（美国食品药品监督管理局）的完整情况说明书中找到，您今天就可以阅读该说明书并将其带回家。

将智能手机的摄像头悬停在此二维码上，即可直接转到相关信息。