# 情况说明书：
# JOHNSON & JOHNSON（也称为JANSSEN）新冠疫苗

Johnson & Johnson/Janssen（缩写是J&J）是在美国可以接种的三种新冠疫苗之一。Johnson & Johnson疫苗只用接种一剂，并会在接种疫苗的2周后开始发挥保护效果。

由于血栓的罕见风险，Pfizer 和 Moderna 疫苗现在比 J&J 疫苗更受欢迎。

J&J疫苗是一种病毒载体疫苗。它包含一种无害的腺病毒（一种普通的感冒病毒），该腺病毒携带了冠状病毒刺突蛋白的基因。因此它能教会您的身体如何识别和对抗导致新冠肺炎的冠状病毒。新冠疫苗：

- **不会** 让您感染新冠病毒或腺病毒。
- **不会** 改变您的 DNA 或遗传物质。
- **不会** 导致不育。
- **不会** 鸡蛋、防腐剂、乳胶、猪肉或其他动物制品，也不含胚胎细胞或冠状病毒。

## J&J疫苗适用于18岁以上的成人

如果您怀孕或哺乳、有严重的过敏、有凝血史或在服用血液稀释剂，请咨询您的医生或诊所。

## 轻度副作用

许多人在接种疫苗后会出现轻度副作用。对于某些人而言,这表明您的身体正在建立保护机制，抵御疾病。即使您没有出现副作用，疫苗同样可以起到保护效果。

### 常见副作用包括




这些症状通常会在几天内消失。如未消失，请咨询医生或诊所。

## 罕见的严重问题

### 过敏反应

有些人会出现严重的新冠疫苗过敏反应，但这种情况并不多见。所有人在接种疫苗后都必须在现场至少等15分钟，以确保没有严重的过敏反应。



### 格林-巴利综合征

格林-巴利综合征（GBS）是一种影响神经系统的疾病。 有些人在接种J&J疫苗后6 周内感染了 GBS，但这种情况非常罕见。

**如果您在接种J&J疫苗后出现以下任何症状，应立即就医：**

- 虚弱或刺痛感，尤其是腿部或手臂
- 行走困难
- 面部运动困难，其中包括说话、咀嚼或吞咽
- 复视或眼睛无法移动
- 膀胱控制或肠道功能出现问题

**为了确保安全，Multnomah县卫生部门不会让在过去六个月内接受过凝血治疗的人员接种该疫苗。如果您在此期间接受过血块治疗，请告诉您的疫苗接种员。我们可以帮助您寻找其他新冠疫苗。**



### 凝血障碍

极少数情况下，某些接种J&J新冠疫苗的人士出现了涉及脑、腹部或腿部血管的血凝块以及血小板（帮助身体止血的血细胞）低下。

**这被称为伴有血小板减少症候群的血栓形成或TTS。这种情况非常严重并可能导致死亡。它的治疗方法与其他血块不同。**

### 接种疫苗后的三周内留意以下较严重的症状



严重头痛或无法消除的头痛



视力模糊



胸痛或严重腹痛



下肢水肿或疼痛



呼吸困难



在注射部位以外的皮肤容易出现瘀伤或微小的血点

**如果出现这些症状，请致电911或前往急诊室。务必要告知医疗机构您接种了Johnson & Johnson疫苗，以便他们正确处置。**

这种问题非常罕见，只有百万分之一的疫苗接种者会发生该问题。它最有可能在注射后6天到3周内发生在18至50岁的女性中。虽然接种疫苗的风险很小，但对大多数这类人而言，接种新冠疫苗的风险会更高。

## 寻求帮助

不要对自己的医疗选择忧心忡忡，这一点很重要。如果您在阅读完上述信息后对接种J&J疫苗仍有所担心，那么您可以获取更多信息或考虑接种其他疫苗。

- 如有疑问，请在接种活动中与工作人员沟通。
- **其他品牌疫苗也可提供，但在今天的活动中可能并未准备。**如需帮忙寻找其他品牌疫苗，请咨询当日的接种活动组织人员、在线访问https://covidvaccine.oregon.gov/或致电2-1-1。

扫我

有关Johnson & Johnson疫苗的更多信息，请参阅美国食品药品管理局(FDA)的完整情况说明书，今天您可以阅读该说明书并将其带回家。

使用手机摄像头扫描二维码，以您的语言查看有关疫苗的更多详细信息。 您可以向工作人员索要纸质副本，也可以向工作人员/您的家人/朋友寻求二维码帮助。